

إستمارة تقييم المستوى المعرفي لمنع قرح الفراش

التاريخ:	إسم الوحدة:
----------	-------------

إختر الإجابة الصحيحة (واحدة فقط):

١. التالي صحيح عن قرح الفراش ما عدا:

- أ- هو فقدان جزئي أو كلى للجلد و الأنسجة المحيطة.
- ب- النتوءات العظمية هي أكثر الأماكن عرضه لحدوث قرحة الفراش.
- ت- منع حدوث قرحة الفراش هي مسؤولية هيئة التمريض.
- ث- القرح قد تنتج عن ضغوط الأدوات الطبية مثل أنابيب المعدة أو القساطر البولية.

٢. كل هذه العوامل تؤدى إلى قرحة الفراش ما عدا:

- أ- عدم القدرة على الحركة.
- ب- المرضى ذو الجلد الداكن.
- ت- سوء التغذية أو السمنة المفرطة.
- ث- إضطراب في الأدراك الحسى.

٣. تشمل الرعاية الأساسية الواجب تقديمها لمنع حدوث قرح الفراش الآتى ما عدا:

- أ- تقييم أرجحية الإصابة بقرحة الفراش.
- ب- رعاية الجلد.
- ت- رعاية السلس البولى و البرازى.
- ث- المضادات الحيوية.

٤. قرحة الفراش من الدرجة الأولى هي:

- أ- فقدان جزئي بالجلد على هيئة خدش.
- ب- إحمرار ثابت بالجلد لا يختفى بالضغط عليه.
- ت- بشرة مائية أو تقرح سطحى.
- ث- حرق بالجلد.

٥. تؤدى قرح الفراش إلى:

- أ- زيادة مدة الأقامة بالمستشفى.
- ب- اضطراب الحالة النفسية.
- ت- التشوه الجسماني.
- ث- جميع ما سبق.

ضع علامة صح أو خطأ:

- () ٦. يتم تقييم أرجحية الإصابة بقرح الفراش فقط عند دخول المريض للمستشفى.
- () ٧. إعادة التموضع كل ساعتين يكفى لمنع حدوث قرح الفراش.
- () ٨. مشاركة المريض وأسرته أساسى عند إعداد برنامج لمنع حدوث قرح الفراش.
- () ٩. يجب عدم الأخطر عن حدوث قرح الفراش حتى لا تتأثر سمعة المستشفى.
- () ١٠. يجب استخدام مراتب ديناميكية متغيرة الضغوط للمرضى الأكثر عرضة لقرح الفراش.

إستماراة تقييم المستوى المعرفي لمنع قرح الفراش

الإجابات الصحيحة:

١. التالي صحيح عن قرح الفراش ما عدا:

- أ- هو فقدان جزئي أو كلى للجلد و الأنسجة المحبوطة.
- ب- النتوءات العظمية هي أكثر الأماكن عرضه لحدوث قرحة الفراش.
- ت- منع حدوث قرحة الفراش هي مسؤولية هيئة التمريض.
- ث- القرح قد تنتج عن ضغوط الأدوات الطبية مثل أنابيب المعدة أو القساطر البولية.

٢. كل هذه العوامل تؤدى إلى قرحة الفراش ما عدا:

- أ- عدم القدرة على الحركة.
- ب- المرضى ذو الجلد الداكن.
- ت- سوء التغذية أو السمنة المفرطة.
- ث- إضطراب في الأدراك الحسى.

٣. تشمل الرعاية الأساسية الواجب تقديمها لمنع حدوث قرح الفراش الآتى ما عدا:

- أ- تقييم أرجحية الأصابة بقرحة الفراش.
- ب- رعاية الجلد.
- ت- رعاية السلس البولى و البرازى.
- ث- المضادات الحيوية.

٤. قرحة الفراش من الدرجة الأولى هي:

- أ- فقدان جزئي بالجلد على هيئة خدش.
- ب- إحمرار ثابت بالجلد لا يختفى بالضغط عليه.
- ت- بثرة مائية أو تقرح سطحى.
- ث- حرق بالجلد.

٥. تؤدى قرح الفراش إلى:

- أ- زيادة مدة الأقامة بالمستشفى.
- ب- اضطراب الحالة النفسية.
- ت- التشوه الجسماني.
- ث- جميع ما سبق.

ضع علامة صح أو خطأ:

- (✗) ٦. يتم تقييم أرجحية الإصابة بقرح الفراش فقط عند دخول المريض للمستشفى.
- (✗) ٧. إعادة التموضع كل ساعتين يكفى لمنع حدوث قرح الفراش.
- (✓) ٨. مشاركة المريض وأسرته أساسى عند إعداد برنامج لمنع حدوث قرح الفراش.
- (✗) ٩. يجب عدم الأخطار عن حدوث قرح الفراش حتى لا تتأثر سمعة المستشفى.
- (✓) ١٠. يجب استخدام مراتب ديناميكية متغيرة الضغوط للمرضى الأكثر عرضة لقرح الفراش.